



Stärken Sie die Tumorabwehr – unabhängig vom PD-L1-Status!^{1,2}

LOQTORZI®: signifikante Überlebensvorteile bei NPC und OSCC^a

Nasopharynxkarzinom (NPC)^b
5-Jahres OS Rate: 52%³

Plattenepithelkarzinom des
Ösophagus (OSCC)^c
mOS: + 4.8 Monate⁴

^avs. Chemotherapie alleine ^bLOQTORZI® in Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit rezidivierendem, für eine Operation oder Strahlentherapie nicht infrage kommendem oder metastasiertem Nasopharynxkarzinom in Kombination mit Cisplatin und Gemcitabin ^cLOQTORZI® in der Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit inoperablem fortgeschrittenem, rezidivierendem oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom des Ösophagus in Kombination mit Cisplatin und Paclitaxel

1. Wang Z-X, et al. Cancer Cell 2022;40(3):277-288. Mai H-Q, et al. JAMA 2023;330(20):1961-1970. Chen Q-Y, et al. 2024 ASCO Annual Meeting. 31 May – 4 June 2024. Chicago, US. Abstract 6039. Fachinformation **LOQTORZI®**, Stand September 2025, Topalliance Biosciences Europe Limited. MAT-87303



Starke Daten

LOQTORZI® ist signifikant wirksam bei OSCC Patienten – unabhängig vom PD-L1-Status¹

Ergebnisse der Jupiter 06-Studie



- **LOQTORZI®*** bietet 1L-OSCC-Patienten sowohl bei hohen als auch niedrigen TPS- und CPS-Scores die Chance von einer Checkpoint-Inhibition zu profitieren^{1,2}
- **LOQTORZI®*** zeigt signifikante Verbesserungen bei OS, PFS und ORR¹
- Im **LOQTORZI®***-Arm wird ein verlängertes OS von 17,7 Monaten erreicht²

Gut handhabbares Sicherheitsprofil



Es gab keinen relevanten Unterschied in der Rate von AEs insgesamt und der Rate von AEs ≥Grad 3 zwischen der **LOQTORZI®*** + Chemotherapie*-Gruppe und der Plazebo + Chemotherapie*-Gruppe.¹

Stärken Sie mit **LOQTORZI®** die Tumorabwehr


* Paclitaxel und Cisplatin für die ersten 6 Behandlungszyklen.

1. Wang Z-X, et al. Cancer Cell 2022;40(3):277-288.

2. Fachinformation LOQTORZIR, Stand September 2025, Topalliance Biosciences Europe Limited.

LOQTORZI® setzt neue Maßstäbe in der Erstlinienbehandlung von OSCC mit einer Verlängerung des medianen OS auf 17,7 Monate*^{1,2}

Co-primärer Endpunkt; finale Analyse (Jupiter-06 Studie)



LOQTORZI® + Chemotherapie*	257	246	226	189	164	140	126	110	98	85	53	28	20	15	11	1	0
Plazebo + Chemotherapie*	257	243	212	175	138	104	85	76	63	58	27	13	8	5	3	1	0

**+4,8
Monate**

in der Gesamtpopulation

HR 0,72
(95% CI 0,58; 0,88);
p=0,0016


Adaptiert von LOQTORZIR SmPC. *Paclitaxel und Cisplatin für die ersten 6 Behandlungszyklen.

1. Wang Z-X, et al. Cancer Cell 2022;40(3):277–288.

2. Fachinformation LOQTORZIR, Stand September 2025, Topalliance Biosciences Europe Limited.

3. EPAR: EMA/362160/2024

LOQTORZI® Verabreichung im praktischen 3-Wochen Intervall¹



*Die Behandlung sollte bis zum Fortschreiten der Krankheit, bis zu einer inakzeptablen Toxizität oder bis zu einer maximalen Dauer von 24 Monaten fortgesetzt werden.¹

LOQTORZI® 240 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Zusammens.: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Das Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslsg. enthält 40 mg/ml Toripalimab. Eine Durchstechflasche mit 6 ml Konzentrat enthält 240 mg Toripalimab. Hilfsstoffe: Zitronensäure-Monohydrat, Mannitol, Polysorbat 80, NaCl, Natriumcitrat-Dihydrat, Wasser für Injektionszwecke. Anwend.: LOQTORZI® wird zur Erstlinienbehandlung des rez. für eine Operation oder Strahlenther. nicht infrage kommendem oder met. Nasopharynxkarzinoms in Komb. mit Cisplatin u. Gemcitabin und des inoperablem fortgeschrittenem, rez. oder met. ösophagealen Plattenepithelkarzinoms in Komb. mit Cisplatin u. Paclitaxel bei Erwachsenen angewendet. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe. Nebenw.: Gelegentlich: Lungenentzündung, immunvermittelte Hautreaktionen, Leberentzündung, Myokarditis, Myositis, Kolitis, Niereninsuffizienz, Nephritis, immunvermittelte Thrombozytopenie, Entzündung der Schilddrüse, Diabetes mellitus/Hyperglykämie, Entzündung der Hypophyse, Infusionsbedingte Reaktionen Selten: Pankreatitis, Zystitis, Arthritis/Arthralgie. Verschreibungspfl. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Warnhinw.: Hinsichtlich der Haltbarkeit der Infusionslsg. ist die Packungsbeilage zu beachten. Nicht verwenden, wenn dieses Arzneimittel sichtbare Partikel enthält. Weit. Ang.: siehe Fachinformation u.a. zu weiteren Nebenwirkungen. Pharmazeutischer Unternehmer: Topalliance Biosciences Europe Limited, Two Dockland Central, Guild Street, I.f.s.c., Dublin 1, Co. Dublin, D01 K2C5, Irland.

LOQTORZI ist eine eingetragene Marke der Coherus Oncology, Inc.

Stand: September 2025 / MAT-83862



Zur Fachinformation

 **LOQTORZI™**
toripalimab injection

